NUEVAS CITAS DE DIPTEROS TAQUINIDOS PARA LA REPUBLICA ARGENTINA *(INSECTA)*

GERARDO LILJESTHROM [1]

En esta contribución se dan a conocer dos especies chilenas y una paraguayo-brasileña que son nuevas para la fauna argentina. Los materiales estudiados (excepto el ejemplar perteneciente a la especie *Copecrypta nitens* cedido en préstamo por el Dr. Mariluis) están incorporados a las colecciones del Museo de La Plata.

Copecrypta nitens (Wiedemann, 1830) Fig.1)

1830. *Tachina nitens* Wiedemann; *Aussereupaische zweiflugelige Insekten Hamm,* 2: 12-684.
1868. *Cuphocera nitens* (Wiedemann) Schiner; *Reise der oesterreichischer Fregatte Novara um die Erde.* Zoologischer theil. Diptera; VI 388 pp.
1917. *Copecrypta ruficauda devia* Townsend; Secondk paper on Brasilian Muscoidea collected by Herbert H. Smith. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 37 (60); 221-223.
1919. *Cipecrypta andina* Townsend; New genera and species of Muscoid flies. *Proc. U.S. Nat. Mus.,* 56 (2301): 541-592.
1929. *Copecrypta nitens* (Wiedemann) Aldrich; *Diptera of Patagonia and South Chile.* 7 *(1) Tachinidae.* 170 pp., London.

Sturmia festiva Cortés, 1944 (Fig.2)

1944 *Sturmia festiva* Cortés; Las especies chilenas del género Sturmia R.D. (Diptera Tachinidae). *Bol. Mus. Nac. Hist. Nat.* 22: 159-169.

Distribución geográfica: CHILE: Valparaiso, Santiago, Maleco y Cautín; REPUBLICA ARGENTINA: Buenos Aires.

Material estudiado: un macho procedente de Las Canaletas (San Pedro, Bs. Aires), (Liljesthröm col., 14-1-1978.

Anomalia: el ejemplar posee una malformación que consiste en la falta de la mitad tergal derecha del tercer segmento aparente del abdomen, observándose en su lugar el correspondiente al segmento anal.

Epalpodes chillanensis Cortés, 1951. (Fig.3)

1951 *Epalpodes chillanensis* Cortés; Nuevos géneros de Tachinidae chilenos con cerdas facio-orales (Diptera Tachinidae). *Rev. Chil. de Ent.* 1:249-262.

(1) Becario Consejo Nacional de Investigaciones Científicas.

Distribución geográfica: CHILE: Ñuble, Osorno; REPUBLICA ARGENTINA: Provincia de Neuquén.

Material estudiado: un macho procedente de Catán–lil (Provincia de Neuquén), (Schajovskoy leg., 24-2-1958).

BIBLIOGRAFIA

CORTES, R., 1944 Las especies chilenas del género *Sturmia* R.D. (Diptera Tachinidae) *Bol. Mus. Mac. Hist. Nat.* 22: 159-169.

1951 Nuevos géneros de Tachinidae chilenos con cerdas facio-orales (Diptera Tachinidae). *Rev. Chil. Ent.* 1: 249-262.

CORTES, R.; Hichins, N., 1969 *Taquinidos de Chile. Distribución geográfica y huéspedes conocidos.* Ediciones de la Universidad de Chile. 99pp., 7pls Santiago, Chile.

GUIMARAES,J.E., 1963 Primeira contribucao ao conhecimento da tribo Cuphoceratini (Diptera Tachinidae). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 61: 153-164.

1971 *Cat. Dipt. Am. south U.S.A.* (104): 1-133.



1-*Copecrypta nitens* (Wiedemann); 2- *Sturmia festiva* Cortes; 3- *Epalpodes chillanensis* Cortes.